




Courbe de croissance et de consommation pour paramétrage du profil animal dans le logiciel InraPorc®

DESCRIPTION DU JEU DE DONNEES


Lieu de mesure : station IFIP de Romillé
 Période : mai-août 2007, bande 22.6
 Age d'entrée en engraissement : 63 j
 Conduite alimentaire : à volonté
 Aliment : teneur par kg :
 9,7 MJ EN, 8,7 g de lysine digestible
 Logement : 12 porcs/case
 distributeur automatique de concentré
 Observation : le poids de fin utilisé pour établir la cinétique de poids est le poids de fin de contrôle.



NIVEAU DE PERFORMANCES

n=31	Engraissement	1 ^{er} départ	Période de contrôle
Poids vif, kg			
début	28		34
fin	118	109	110
Durée, j	100		83
GMQ, g/j	904		917
IC			2,54
Rendement chaud, %	79,0		78,9 ¹
TMP Uniporc, %	60,4		

1. Corrigé au poids de fin de contrôle +0,015 point par kg d'écart (PVfin contrôle - PVabattage).



PARAMÈTRES

Courbe de croissance : PV (kg) = f(age)

n=31	Modèle de Gompertz		
B	0,01560	PDmoyen	145
Age1	70	PV1	33,8
Age2	154	PV2	109,9


Courbe d'ingéré (Fonction Gamma)

n=31	CMJ (kg/j) = (a x PV x e ^{-b x PV} + 1) x c x PV ^{0,60}		
a	4,4810	Q50	2,077
b	0,0204	Q100	2,599

PV : poids vif (kg),
 CMJ : consommation moyenne journalière d'aliment (kg/j),
 Q50 : espérance de la CMJ à 50 kg,
 Q100 : espérance de la CMJ à 100 kg.

Modèle de Gompertz :

$$PV(AGE) = PV2 \times \left(\frac{PV2}{PV1} \right)^{\frac{1 - \left\{ \frac{e^{(-B \times (Age2 - Age1))} - e^{(-B \times (AGE - Age1))}}{(-1 + e^{(-B \times (Age2 - Age1))}}) \right\}}{1}}$$



Précautions d'utilisation :

Certains porcs ont des performances supérieures au profil moyen. L'utilisation des équations pour raisonner un apport multiphase implique que le besoin de certains porcs ne sera pas couvert. Dans ce cas, il est conseillé d'augmenter de 10 à 15 % les apports en acides aminés.