




Courbe de croissance et de consommation pour paramétrage du profil animal dans le logiciel InraPorc®

DESCRIPTION DU JEU DE DONNEES


Lieu de mesure : station IFIP de Romillé
 Période : février-juin 2008, bande 24.6
 Age d'entrée en engraissement : 62 j
 Conduite alimentaire : à volonté
 Aliment : teneur par kg :
 9,7 MJ EN, 8,7 g de lysine digestible
 Logement : 12 porcs/case
 distributeur automatique de concentré
 Observation : le poids de fin utilisé pour établir la cinétique de poids est le poids de fin de contrôle.



NIVEAU DE PERFORMANCES

n=28	Engraissement	1 ^{er} départ	Période de contrôle
Poids vif, kg			
début	24		24
fin	116	105	106
Durée, j	103		91
GMQ, g/j	891		904
IC			2,53
Rendement chaud, %	79,3		79,1 ¹
TMP Uniporc, %	59,1		

1. Corrigé au poids de fin de contrôle +0,015 point par kg d'écart (PVfin contrôle - PVabattage).



PARAMÈTRES

Courbe de croissance : PV (kg) = f(age)

n=28	Modèle de Gompertz		
B	0,01915	PDmoyen	143
Age1	62	PV1	24,1
Age2	154	PV2	106,3


Courbe d'ingéré (Fonction Gamma)

n=28	CMJ (kg/j) = (a x PV x e ^{-b x PV} + 1) x c x PV ^{0,60}		
a	4,7118	Q50	2,143
b	0,0195	Q100	2,741

PV : poids vif (kg),
 CMJ : consommation moyenne journalière d'aliment (kg/j),
 Q50 : espérance de la CMJ à 50 kg,
 Q100 : espérance de la CMJ à 100 kg.

Modèle de Gompertz :

$$PV(AGE) = PV2 \times \left(\frac{PV2}{PV1} \right)^{\frac{1}{1 - \left(\frac{e^{-B \times (Age2 - Age1)} - e^{-B \times (AGE - Age1)}}{-1 + e^{-B \times (Age2 - Age1)}} \right)}}$$



Précautions d'utilisation :

Certains porcs ont des performances supérieures au profil moyen. L'utilisation des équations pour raisonner un apport multiphase implique que le besoin de certains porcs ne sera pas couvert. Dans ce cas, il est conseillé d'augmenter de 10 à 15 % les apports en acides aminés.